



Moniteur d'eau Cuming

Varanus cumingi

Distribution

Asie du Sud et du Sud-Est



Taille adulte

120-182 cm
(48-72 inches)



Durée de vie

20+ years



Expérience

Advanced



Manipulation

Peut être
manipulé



Environnement naturel

L'aire de répartition naturelle du *Varanus cumingi* se trouve principalement dans les forêts primaires et secondaires et les dans terres cultivées.

Habitat

Le *Varanus cumingi* se porte mieux dans un vaste terrarium en bois. Le bois étant un excellent isolant thermique. Contrairement à un terrarium en verre, où il sera nécessaire de chauffer plus. Un terrarium en bois permet un meilleur contrôle des températures requises à l'intérieur de l'habitat.

La taille minimale du terrarium/enclos est de 386 x 243 x 182 cm (156 x 96 x 72 pouces), ce qui permet une longueur suffisante pour permettre la création d'un gradient de température. Il est néanmoins possible de fournir un environnement plus grand à votre animal.



Températures / Chauffages

Le *Varanus cumingi* aura besoin d'une plage de température de 23-48°C (75-120°F)

Point chaud	Températures ambiante en journée	Température ambiante de nuit
48°C (120°F)	26-29°C (80-85°F)	23-26°C (75-80°F)



La température ambiante est facilement atteignable à l'aide d'une ampoule chauffante comme Eco Halogen de Reptile Systems. L'ampoule chauffante sera placée dans un support d'ampoule comme le Clamp Lamp de Reptile Systems, qui est en céramique résistant à la chaleur.

Il se peut que vous soyez obligé d'utiliser plusieurs supports d'ampoule côtes à côtes pour créer une plus grande surface de chauffe pour un spécimen adulte.

Pour la nuit, vous pouvez également utiliser une ampoule en céramique de faible puissance de Reptile Systems en combinaison avec un support d'ampoule Clamp Black Medium de Reptile Systems. Veillez toujours à ce que les systèmes chauffant passent par un thermostat ou dimming thermostat (si approprié) et à ce qu'ils soient correctement protégé afin que votre animal ne puisse pas se brûler.

Éclairage

Le *Varanus cumingi* se situe en zone 3 de l'échelle de Ferguson et nécessitent un indice UVI de 2.6 à 7.4 au point chaud, allant jusqu'à zéro dans les zones plus froides/ombragées du terrarium la photopériode idéale serait de 12 heures d'éclairage quotidien.

L'indice d'UVI recommandée peut être facilement atteint en utilisant une lampe à vapeur de Mercure en combinaison avec un éclairage T5 de l'indice UVI conseillé pour atteindre l'UVI requis.

On notera que les lampes à vapeur de mercure fournissent des UVA, des UVB et de la chaleur et ne peuvent pas être contrôlées par un thermostat.



Substrat



En général on proposera un substrat résistant à l'humidité comme la tourbe. Il faudra une épaisseur conséquente pour qu'ils puissent creuser et s'enfouir s'ils le souhaitent.

Ce sol peut être mélangé avec du sable, de la mousse, des feuilles mortes et de l'écorce pour créer un aspect plus naturel.

Eau / humidité

Le *Varanus cumingi* est un très bon nageur. Il est donc primordial de proposer un bassin adapté à la taille de votre animal. Celui-ci favorisera la nage permettant de recréer des comportements naturels chez votre animal.

Une humidité ambiante de 60 - 70% est idéale pour un *Varanus cumingi*.



Régime alimentaire / Nutrition

Le *Varanus cumingi* est carnivore et possède un énorme appétit.

Les juvéniles sont principalement insectivores. Il est important de donner une grande variété d'insectes, comme les grillons domestiques (*Acheta domestica*), les blattes dubia (*Blattella dubia*), les criquets migrateurs (*Locusta migratoria*), les vers à soie (*Bombyx mori*), les vers morio (*Zophobas morio*), les vers de farine (*Tenebrio molitor*) et bien d'autres insectes et aliments disponibles dans le commerce. Il est important de le rappeler, il faut nourrir et hydrater les insectes nourriciers avant de les donner comme nourriture à vos animaux.

Cela peut être facilement réalisé en utilisant la nourriture pour insectes comme Insect Food de Reptile Systems.

En grandissant, vous pouvez ensuite introduire des rongeurs, des poissons et de la volaille.

Il est nécessaire d'apporter des compléments alimentaires lors de certains nourrissages. Pour cela, nous vous proposons d'utiliser Reptile Systems Calcium Ultra doit être distribué 3 fois par semaine (en poudre, à saupoudrer sur les insectes nourriciers) et Reptile Systems Vit-a-max doit être utilisé deux fois par semaine (en poudre à saupoudrer sur les insectes nourriciers).



Manipulation

Le *Varanus cumingi* est une espèce manipulable. Mais les juvéniles peuvent être nerveux et les jeunes adultes peuvent devenir turbulents, mais avec de la patience et un peu de travail, ils peuvent être apprivoisés. Lors de l'arrivée de nouveaux reptiles, il est suggéré de prévoir une période dite d'acclimatation de deux semaines au cours de laquelle aucune manipulation n'est effectuée. Les manipulations doivent être limitées à 20-30 minutes à la fois, afin que votre animal ne stress de trop et qu'il n'ait trop froid.

